



Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião- dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de esquecimento de dose, passar a pomada ao lembrar, não sobrepondo a dose. Não ultrapassar 2 aplicações diárias.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião- dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

"Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações de hipersensibilidade"

Informe ao seu médico, cirurgião- dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidos casos de superdosagem com o uso de Ad-Muc®.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro mé-

dico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Registro MS 1.0974.0172

Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Jr.

CRF-SP nº 5143



Fabricado e Comercializado por:
Avert Laboratórios Ltda.

Rua Domingos Graziano, 104 - Araras - SP
CEP: 13600-718 - CNPJ 44.211.936/0001-37
Indústria Brasileira

Registrado por:

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Av. Paulo Ayres, 280 - Taboão da Serra -SP

CEP: 06767-220 - SAC 0800 17 2119

CNPJ 49.475.833/0001-06

Indústria Brasileira

*Sob licença de Merz Pharmaceuticals GmbH,
Frankfurt/Alemanha*



**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em
(28/07/2014)**

Ad.muc®
Extrato fluido de *Chamomilla recutita*
MEDICAMENTO FITOTERÁPICO



IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

• APRESENTAÇÕES

Pomada de 100 mg em embalagem com bisnaga de 10 g.

• USO EXTERNO.

• USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS.

• COMPOSIÇÃO

Pomada

Ad-Muc® 100 mg:

Cada 1 g da pomada contém:

Extrato fluido de *Chamomilla recutita*.....100 mg
(equivalente a 0,30 mg de apigenina - 7 glucosídeo)
Excipientes: Tintura de mirra, glicerol, álcoois de lanolina, álcool cetoestearílico, petrolato branco, petrolato líquido, goma xantana, metilparabeno, óleo de menta, sacarina sódica e água purificada.



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Ad-Muc® é indicado para o tratamento das gengivas e da mucosa oral, nos casos de gengivite (inflamação da gengiva), estomatite (inflamação





da mucosa oral) e outras inflamações da cavidade bucal. Também é indicado nas irritações bucais originadas de dentaduras mal ajustadas.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Ad-Muc® contém em sua formulação extrato fluido de Camomila (*Chamomilla recutita*), que possui reconhecidas propriedades antiinflamatórias. A Camomila possui diversas substâncias antiinflamatórias que auxiliam no processo de cicatrização de pequenas feridas na mucosa bucal: o camazuleno exerce efeito antiinflamatório, enquanto o α -bisabolol, outro componente da camomila, também apresenta ação antiinflamatória e promove a regeneração tecidual (cicatrização). Os polissacarídeos presentes na camomila possuem atividade imunoestimulante, ou seja, estimulam os mecanismos de defesa do corpo. O efeito antibacteriano foi demonstrado com o uso do óleo essencial da camomila.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ad-Muc® não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, aos parabenos (metilparabeno, presente na formulação), e às plantas da família Compositae.

Este medicamento é contra-indicado para uso por lactantes e crianças menores de 3 anos de idade.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gravidez – até o momento, não foram relatados efeitos adversos com o uso de **Ad-Muc®** em mulheres grávidas. Entretanto, recomenda-se evitar o uso excessivo durante o período de gestação. Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez, desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação – **Ad-Muc®** não deve ser utilizado por mães que estejam amamentando.

Pediatria – **Ad-Muc®** não deve ser usado por crianças menores de 3 anos de idade.

Geriatrics (idosos) – não há restrições específicas para o uso de **Ad-Muc®** em pacientes idosos.

Não são conhecidas medicamentosas com o uso de **Ad-Muc®**.

Não são conhecidas interferências em exames laboratoriais com o uso de **Ad-Muc®**.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha **Ad-Muc®** em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do produto: Pomada marrom-amarelada a marrom, com textura cremosa e odor de menta e camomila.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uso tópico. Este medicamento deve ser administrado somente pela via recomendada para evitar riscos desnecessários.

Lavar e secar as mãos antes do manuseio do produto. Aplicar **Ad-Muc®** duas vezes ao dia, por exemplo, pela manhã e à noite, após escovar os dentes ou após as refeições. Depois do desaparecimento dos sintomas, recomenda-se continuar com a aplicação de **Ad-Muc®** uma vez ao dia, até o desaparecimento dos sintomas ou conforme critério médico.

Aplicar **Ad-Muc®** na gengiva com a ponta do dedo seco (utilizar o dedo indicador para as regiões externas da gengiva e o dedo polegar para as regiões internas) e massagear as mucosas. A gengiva deve ser massageada em movimentos circulares, dirigidos para a coroa do dente. Em caso de salivação aumentada, deve-se secar a gengiva antes da massagem.

