

Acnase GEL

PERÓXIDO DE BENZOÍLA 5%

Contra cravos e espinhas | pele oleosa

USO ADULTO
E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS Uso Externo Peso líq.: **20 g**

COMPOSIÇÃO:

Cada g contém 50 mg de peróxido de benzoíla.
Excipientes: propilenoglicol, associação de álcoois graxos e emulsificantes não iônicos, coco glicerídeo, éster cáprico caprílico, isononanoato de cetosteárla, sclerotium gum, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, hidróxido de sódio, simethicone emulsão, água purificada q.s.p. - 1 g

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO DO MEDICAMENTO: **ACNASE GEL** atua no tratamento tópico da acne. Seu mecanismo de ação se deve ao poder bactericida e redutor da oleosidade da pele conferido pelo peróxido de benzoíla.

INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO: **ACNASE GEL** é indicado para o tratamento tópico da acne.

CONTRAINDICAÇÃO: Contraindicado para menores de 12 anos. Medicamento contraindicado a indivíduos com hipersensibilidade ao peróxido de benzoíla.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA. INFORME AO SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO. INFORME AO SEU MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.

PRECAUÇÕES: Evitar exposição ao sol durante o tratamento devido a possibilidade de manchas na pele. O peróxido de benzoíla pode descolorir os cabelos e manchar roupas. Pode ocorrer sensibilização de contato em alguns pacientes, além de vermelhidão e descamação. Em uso prolongado ocasiona dermatite. Reações Adversas: Dermatológicas: dermatite de contato, eritema, ardor, vermelhidão e descamação. Imunológicas: hipersensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: o uso concomitante de outras preparações tópicas para o tratamento da acne, especialmente abrasivos ou descamantes, pode levar a uma irritação cutânea cumulativa e, por isso, deve ser feito com orientação médica.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS. INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

ASPECTO FÍSICO: verifique se o medicamento que você comprou possui as seguintes características: gel branco, com odor característico.
ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO: é importante efetuar o teste de adaptação e, só após esse período, seguir a posologia indicada. Após os primeiros dias de aplicação, a pele começará a descamar como se tivesse sido queimada pelo sol, podendo ocorrer ardor, ressecamento e vermelhidão que, se moderados, são normais e desejáveis.



MODO DE USO: Uso externo. Aplicar fina camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas vezes ao dia. Recomendável uso de bloqueador solar não alcoólico durante o dia.

TESTE DE ADAPTAÇÃO

Primeiro passo: durante 4 dias, lave o rosto antes da aplicação, com água e sabonete neutro. Aplique **ACNASE GEL** na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 2 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Havendo boa tolerância, siga o segundo passo.

Segundo passo: durante 4 dias, lave o rosto antes da aplicação, com água e sabonete neutro. Aplique **ACNASE GEL** na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 4 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Não ocorrendo desconforto ou intolerância durante esses 4 dias, siga o terceiro passo.

Terceiro passo: durante 4 dias, lave o rosto antes da aplicação, com água e sabonete neutro. Aplique **ACNASE GEL** na área afetada na hora de deitar e deixe durante a noite. Remova com água e sabonete neutro. Após o término da fase de adaptação, utilize o produto normalmente, conforme a posologia.

POSOLOGIA:

antes de cada aplicação, lave o local com água e sabonete neutro. Aplique **ACNASE GEL** uma ou duas vezes ao dia, de manhã e à noite, desde que a área tratada não seja exposta ao sol. Evite o sol intenso, mas, se houver necessidade de exposição moderada ao sol, **ACNASE GEL** não deve ser usado durante o dia. Nesse caso, após a limpeza da área em tratamento, deve-se aplicar um bloqueador solar não alcoólico, dando-se preferência aos produtos não comedogênicos. A melhora significativa na redução de cravos e espinhas costuma ser observada a partir da 4ª semana, mas o tratamento da acne, geralmente, leva de 12 a 20 semanas.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

REAÇÕES ADVERSAS:

Dermatológicas: dermatite de contato, eritema, ardor, vermelhidão e descamação. Imunológicas: hipersensibilidade. Cerca de 2% das pessoas são alérgicas ao peróxido de benzoíla. Se as reações forem exageradas, pare o tratamento e em alguns dias sua pele voltará ao normal. Compressas frias no local podem produzir alívio da irritação.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSAGEM:

em caso de superdosagem, suspenda o uso do produto por alguns dias, e a pele voltará ao normal. Para aliviar os sintomas, realize compressas frias no local. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, se a reação for devida ao uso excessivo, e não à alergenidade, deve-se reduzir a frequência de uso do produto.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

o medicamento deve ser mantido bem fechado e armazenado em temperatura ambiente (de 15 a 30°C). Prazo de validade: 24 meses. Vide bsnaga e cartucho.

ATENÇÃO:

não utilize o produto fora do prazo indicado, pois o efeito esperado poderá não ocorrer.

PACIENTES IDOSOS:

não existem recomendações específicas para pacientes idosos.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC N° 199/2006.

AFE N° 1.00974-4

Farm. Resp.: Dante Alario Junior - CRF-SP n° 5143

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Avenida Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039
Bragança Paulista - SP - CEP 12929-600
CNPJ 49.475.833/0018-46 - Indústria Brasileira

SAC
0800 724 6522



PHC 3164 - ME154812 - DIM.: 240 X 150 mm