

**colágeno
não hidrolisado
tipo II
40 mg**

CÁPSULAS GELATINOSAS MOLES
COLORIDO ARTIFICIALMENTE

ZERO AÇÚCAR | ZERO LACTOSE | NÃO CONTÉM GLÚTEN

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 0,25 g (1 cápsula)

Quantidade por porção		% VD
Carboidratos, dos quais:	0 g	0 %
Açúcares	0 g	0%

Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras *trans*, fibra alimentar e sódio.

**% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Fornece 40mg de colágeno não hidrolisado tipo II por porção diária recomendada.

INGREDIENTES: óleo de soja, colágeno não hidrolisado tipo II, emulsificante lecitina de soja e cápsula (água purificada, gelificante gelatina, umectante glicerol, glazeante cera de abelha, corantes dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo).

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PODE CONTER DERIVADOS DE PEIXE E AMENDOIM.

O que é o colágeno não hidrolisado tipo II?

O colágeno não hidrolisado tipo II é um suplemento alimentar que auxilia na manutenção da cartilagem articular.

A cartilagem articular é composta por células denominadas condrócitos e pela

matriz extracelular, composta principalmente por colágeno tipo II e proteoglicanos. Essas moléculas conferem as propriedades da cartilagem como rigidez e elasticidade. O equilíbrio entre a produção e a renovação desses componentes garante a manutenção das funções da cartilagem¹.

Durante a vida e em algumas doenças, como a osteoartrite, o colágeno tipo II e outras estruturas articulares sofrem degeneração, resultando em perda funcional da cartilagem¹.

A suplementação de colágeno auxilia no tratamento de algumas desordens articulares, como a osteoartrite e artrite reumatoide, que envolvem inflamação e degradação da cartilagem articular¹⁻⁴. O uso continuado de colágeno tipo II não hidrolisado leva a redução da dor e melhora da mobilidade articular em indivíduos com doenças articulares, bem como em indivíduos saudáveis, com dor relacionada à prática de atividade física.

Como devo usar o colágeno não hidrolisado tipo II?

Ingerir 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Como o colágeno não hidrolisado tipo II deve ser guardado?

Guardar em local fresco e seco (15° a 30°). Esta embalagem foi selada para sua proteção. Não utilize o produto em caso de violação.

O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.

Referências bibliográficas:

- 1 - Rezende UM. Cartilagem Articular e Osteoartrose. Acta Ortop Bras 8(2) - abr/jun, 2000
- 2 - Crowley DC, et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Nt J Med Sci 2009; 6(6):312-321.
- 3 - Lugo J, et.al. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013; 10: 48.
- 4 - Bioiberica. B-2COOL® Low dose, great effects. Disponível em: https://www.bioiberica.com/files/pagina/pdf/20180308125339_1.pdf Acesso em: 12/06/2018.

Reg. M.S.: 6.7198.0070

Fabricado por Catalent Brasil Ltda.
Av José Vieira 446 Distrito Industrial Indaiatuba SP
13347-360 CNPJ 45.569.555/0007-82
Resp. Técnico Morena E.G.C. Melaré CRF/SP 43.652
Indústria Brasileira
ou

Catalent Brasil Ltda.
Av Jerome Case 1277 Distrito Industrial Sorocaba SP
18087-220 CNPJ 45.569.555/0001-97
Resp. Técnico Adriana Satsuki Mizobuti Giannetti CRF/SP 26.198
Indústria Brasileira

Distribuído por Biolab Farma Genéricos Ltda.
Extrema MG CNPJ 33.150.764/0004-65
SAC 0800 724 6522

biolab
FARMA GÊNERICOS

ME245056 - PHC 3619 - DIM. 240 x 150 mm